

Toelichting

Coloscopie en diabetes mellitus

Inleiding

Deze informatie is alleen bedoeld voor mensen die een coloscopie onderzoek krijgen en gewend zijn tabletten en/of insuline te gebruiken voor diabetes mellitus.

Wijziging diabetesmedicatie

Als u tabletten gebruikt

Dag vóór het onderzoek: Uw normale dosering tabletten voor diabetes.

Dag van het onderzoek: U neemt 's morgens geen tabletten in.

Na het onderzoek: U neemt uw ochtendmedicijnen in bij de eerste maaltijd. Bij de volgende maaltijd neemt u weer de gebruikelijke dosering tabletten.

Als u tabletten gebruikt en 1 keer per dag insuline spuit

Dag vóór het onderzoek: Uw normale dosering **tabletten** voor diabetes. U spuit voor het slapen gaan de 75% van de gebruikelijke hoeveelheid **insuline**.

Dag van het onderzoek: 's Morgens geen tabletten innemen.

Na het onderzoek:

Tabletten: U neemt uw ochtendmedicijnen in bij de eerste maaltijd. Bij de volgende maaltijd neemt u weer uw gebruikelijke dosering.

Insuline: 's Avonds gewoon uw gebruikelijke dosering.

Als u 2 keer per dag insuline spuit

Dag vóór het onderzoek: 's Morgens spuit u uw gebruikelijke hoeveelheid insuline. 's Avonds spuit u 75% van uw hoeveelheid insuline die u bij het avondeten gewend bent te spuiten.

Dag van het onderzoek:

Bij de eerste maaltijd na het onderzoek spuit u 50% van de gebruikelijke dosering insuline die u normaal voor het ontbijt spuit. Bij de volgende maaltijd neemt u weer uw gebruikelijke dosering insuline.

Als u 4 keer per dag insuline spuit

Dag vóór het onderzoek: Bij het ontbijt en bij de lunch spuit u uw gebruikelijke dosering kortwerkende insuline. Bij de avondmaaltijd moet u de dosering kortwerkende insuline aanpassen op geleide van uw bloedsuikermeting. Voor het slapen gaan, spuit u 75% van de hoeveelheid langwerkende insuline die u gewend bent te spuiten.

Dag van het onderzoek:

Na het onderzoek spuit u bij de eerste maaltijd uw gebruikelijke dosering insuline.

Bloedglucosecontrole

De dag vóór het onderzoek en de dag van het onderzoek moet u regelmatig bloedglucose controleren. Bij een lage bloedglucose kunt u limonadesiroop drinken en druivensuikertabletten innemen.

Tenslotte

Neem druivensuikertabletten mee naar het ziekenhuis. Mocht dit nodig zijn, dan heeft u iets bij de hand om een hypo te voorkomen.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts of uw diabetesverpleegkundige.

Overige telefoonnummers

Diabetesteam: (0320) 271647

Scopiekamer: (0320) 271256